СОВРЕМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ БИОМАРКЕРЫ ФАКТОРОВ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА

Сапрыгин Д.Б.

**Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики
Российская медицинская академия последипломного образования**

Причины летальности в индустриально развитых странах

ЛЕТАЛЬНОСТЬ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РФ

- В структуре причин общей смертности ССЗ составляют от 48,3 до 56,2% (2010-2015г.г.).
- Ежегодно от ССЗ умирает более 1млн. человек; из них около 100 тысяч – в трудоспособном возрасте.
- Смертность мужчин трудоспособного возраста от ССЗ превышает уровень смертности женщин этого же возраста почти в 5 раз!!!
- 375 тысяч человек а год становятся инвалидами по причине ССЗ

SOS!!!!

РОССИЙСКИЕ МУЖЧИНЫ НУЖДАЮТСЯ В СПАСЕНИИ ОТ ССЗ

«Смертность от ИМ среди российских мужчин 35-74 лет в девять раз выше, чем в Австрии или Франции, а от инсульта – в 13 раз».

Кривая смертности в РФ начинает резко расти с возраста в 20 лет. 43% Российских мужчин не доживает до 65 лет.

Скворцова В.И. сообщила, что за первую половину 2017г. Российские мужчины стали жить на год дольше - до 67,5 лет.

СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА АТЕРОСКЛЕРОЗА

Атеросклероз (атероматоз) - от греч. *athera* – «кашица», *scleros* – «твердый», *oma* – «масса».

Системная, хроническая патология, сопровождающаяся развитием эндотелиальной дисфункции при активном вовлечении в процесс воспалительного и иммунного компонентов – от формирования начальных изменений (юношеский возраст) до возникновения возможных фатальных событий (ОКС, инсульта и др.). Характеризуется субклиническим течением до 50-60 лет у мужчин и начиная с 60 лет у женщин.

Стенка артерии в норме.

Свободный ток богатой кислородом артериальной крови ко всем органам и тканям крови

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ АТЕРОГЕНЕЗА

I этап

Образование липидных пятен

II этап

**Формирование атеросклеротической
бляшки - переход липидного пятна в
атерому**

Образование липидных пятен (липидоз).

Накопление липопротеидов в интимае артерии с образованием липидных пятен

Клинические проявления атеросклероза.

Разрушение фиброзной покрышки (атероматозная язва), кровоизлияния в толщу бляшки, образование тромботических наложений на месте атероматозной язвы. На этой стадии развиваются: тромбоз, эмболия, инфаркт, аневризма сосуда, артериальное кровотечение.

ФАКТОРЫ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА (КВР) И ЛАБОРАТОРНЫЕ БИОМАРКЁРЫ

Немодифицируемые

- Возраст;
- Пол;
- Семейный анамнез;
- Генетические факторы

Модифицируемые

- Гипертензия;
- Курение;
- **Дислипидемия, гиперхолестеринемия;**
- **Метаболический синдром;**
- **Диабет;**
- **Ожирение (общее и висцеральное);**
- Атерогенная диета;
- Малоактивный образ жизни;

ОСНОВНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ БИОМАРКЁРЫ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ РИСКОВ

ЛАБОРАТОРНЫЕ БИОМАРКЁРЫ ПЕРВОЙ ЛИНИИ КОНТРОЛЯ:

- ДИСЛИПИДЕМИЯ: ГиперХС, гиперХС ЛПНП, снижение ХС ЛПВП, гипертриглицеридемия, гиперконцентрация липопротеина (а). Вторичные гиперлипидемии. Нарушение экзокринной функции поджелудочной железы;
- ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЕЙ HS CRP, ГОМОЦИСТЕИНА, ТРОПОНИНОВ Т и I.

ЛАБОРАТОРНЫЕ БИОМАРКЁРЫ ВТОРОЙ ЛИНИИ КОНТРОЛЯ:

- ОЖИРЕНИЕ, ВИСЦЕРАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ (особенно на фоне гипертриглицеридемии), низкая физическая активность, несоблюдение диеты – употребление пищи с высоким гликемическим индексом, переедание, низкая физическая активность;
- НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ (стеатоз и стеатогепатит);

Lipoprotein Subclasses

Berkeley HeartLab, Inc.
Advanced Cardiovascular Diagnostics

THE WORLD CONGRESS OF CLINICAL LIPIDOLOGY

6-8 DECEMBER, 2012 | BUDAPEST, HUNGARY

**ХС ЛПНП и/или АпоВ- основные
предикторы риска прогрессирования
атеросклероза**

**Кардиоваскулярный риск
связан в большей степени с
количеством и размером
циркулирующих атерогенных
частиц ХС ЛПНП.**

Lp(a)

**Аpo (a) содержит домены,
гомологичные «kringle» IV и V
плазминогена**

АПОЛИПОПРОТЕИН (a) – НЕЗАВИСИМЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ФАКТОР РИСКА ССЗ

**Атерогенное
действие**

**Тромбогенный
эффект**

Ассоциирован с развитием ИБС и системного атеросклероза (периферическое артериальное русло, аневризма абдоминального отдела аорты и магистральных артерий, кровоснабжающих головной мозг).

Atherogenic lipoproteins

- **Remnant particles**
- **LDL-particles**
- **Lipoprotein(a)**

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ – СОВРЕМЕННАЯ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКАЯ (гипо ХС) ТЕРАПИЯ :

- **Ингибиторы ГМГ КоА-редуктазы – статины;**
- **Ингибиторы кишечной абсорбции холестерина –
Эзетимиб (Эзетерол);**
- **Экстракорпоральная терапия (аферез);**
- **Ингибиторы фермента PCSK9 (пропротеиновая
конвертаза субтилизин кексин типа 9);**
- **Ингибиторы транспортного белка эфира
холестерина (СЕТР).**

СТАТИНЫ – ИНГИБИТОРЫ ФЕРМЕНТА 3-ГИДРОКСИ-3-МЕТИЛГЛЮТАРИН-КОЭНЗИМА РЕДУКТАЗЫ (ГМГ-КоА редуктаза)

Статины блокируют синтез ХС в гепатоцитах, приводя к экспрессии рецепторов к ЛПНП, в результате чего ХС ЛПНП выводятся из кровотока. Эти препараты снижают уровень ХС ЛПНП на 25% и снижают кардиоваскулярный риск развития ССЗ как при первичной, так и при вторичной профилактике (на 25-45%).

ПЛЕЙОТРОПНЫЙ (АНТИАТЕРОГЕННЫЙ) ЭФФЕКТ СТАТИНОВ

Circulation

JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION

2013 ACC/AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines

2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidemias. The task Force for the Management of Dyslipidemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS)

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ «РУКОВОДСТВА» АСС/АНА 2013

Рекомендуется интенсивная терапия статинами:

- Мужчинам и женщинам в возрасте 49-70 лет с сердечно-сосудистым риском $\geq 7,5\%$ (в течение 10 лет);
- Всем пациентам с клиническими проявлениями ИБС и без них с уровнем ХС ЛПНП выше 4,94 ммоль/л;
- Диабетикам от 40 до 75 лет;
- С сердечно-сосудистыми заболеваниями атеросклеротического генеза (ИБС, инсульты, заболевания периферических артерий).

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ «РУКОВОДСТВА» ESC/EAS 2016

- Приоритет в первичной профилактике ССЗ немедикаментозным методам воздействия;
- Определены целевые уровни для гиполипидемической терапии (определение ХС не-ЛПВП) ;
- Основным средством коррекции ДЛП остаются статины;
- При семейной ГХС или непереносимости статинов рекомендуется назначение ингибиторов PCSK9.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ (ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ) ДИСЛИПИДЕМИИ

Семейная ГХС - FH (гомозиготная и гетерозиготная формы)

Основные гены ассоциированные с FH – рецептор ЛПНП (LDLR), пробелок конвертазы субтилизин/кексин – 9-го типа (PCSK9), апо B100.

В настоящее время современные биочиповые технологии в комбинации с мультиплексной ПЦР детектируют более 40 генетических полиморфизмов мутаций, связанных с семейной ГХС

НОВЫЙ КЛАСС ХС-СНИЖАЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ –ИНГИБИТОРЫ PCSK9

Белок PCSK9 (пропротеин конвертаза субтилизин/кексин тип 9) контролирует экспрессию рецепторов ЛПНП на поверхности гепатоцитов. PCSK9 действует как связывающий белок с рецепторами ЛПНП (LDL-R), способствуя их деградациии, что в свою очередь приводит к торможению удаления ХС ЛПНП из циркулирующей крови. Синтез PCSK9 может повышаться на фоне лечения статинами, как ответ организма на снижение уровней ХС ЛПНП.

Механизм действия антител против PCSK9

ЭВОЛОКУМАБ (РЕПАТА)

Рекомендуется назначение пациентам с первичной гиперлипидемией (гетерозиготной и гомозиготной семейной ГХС) и со смешанной дислипидемией (типы IIa, IIb, IV по классификации Фредриксона), а также в качестве дополнения для снижения ХС-ЛПНП, ХС не-ЛПВП, ХС-ЛПОНП, Лп(а)

НОВЫЙ КЛАСС ХС-СНИЖАЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. ИНГИБИТОРЫ PCSK9

Ингибиторы PCSK9 ((моноклональные АТ к PCSK9 (эволокумаб - «Репата»)), вводят подкожно 1 или 2 раза в месяц, в том числе и у пациентов, не отвечающих на терапию статинами. Показано, что это приводит к снижению уровня ХС ЛПНП на 55-76%.

FDA одобрила применение новых препаратов в качестве дополнения к диете и при низкой эффективности максимально переносимых доз статинов (с гетерозиготной семейной ГХ и тяжелым атеросклеротическим поражением артериального русла).

НОВЫЙ КЛАСС ХС-СНИЖАЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. ИНГИБИТОРЫ PCSK9

Новый препарат «Inclisiran» – ингибитор синтеза PCSK9.

Резко снижает уровень ХС ЛПНП.

Может применять в виде одной (единственной) инъекции каждые шесть месяцев в отличие от Эволокумаба или Алирокумаба.

Таким образом, применение «Inclisiran» связано с длительным снижением как PCSK9, так и ХС ЛПНП.

Ray KK et al., Engl. J. Med. 2017

3rd World Congress on
Clinical Lipidology
10 – 12 February, 2017 | Brisbane, Australia

- **Classification and Detection of Dyslipidemias**
- **Lipid Guidelines**
- **Atherosclerosis Imaging**
- **Familial Dyslipidemias**
- **Difficult to Treat Hyperlipidemia**
- **Statin Resistance / Intolerance**
- **Lipid Control in Diabetes and Metabolic Syndrome**
- **Diet and Neutraceuticals**
- **Novel Drugs**
- **HDL, TG, LP(a)**
- **Apheresis**

-
- «FOURIER» - рандомизированное, двойное слепое, плацебо контролируемое исследование – «Дальнейшее исследование кардиоваскулярных исходов при применении ингибиторов PCSK9 (ЭВОЛОКУМАБ) у пациентов с повышенном риском»
 - В исследование включено 27564 пациента из более 100 мед.центров 49 стран, все из которых принимали статины.
 - Длительность исследования – 22 месяца. Закончилось в феврале 2017 г.

Основные результаты исследования “FOURIER”

- Выявлено резкое снижение уровня ХСЛПНП – на 59% от исходного (с 2,4 до 0,8 ммоль/л);
- 94% пациентов достигли уровня ЛПНП менее 1,8 ммоль/л;
- Установлено достоверное снижение нефатального ИМ, но не фатальных осложнений (инфаркт миокарда, инсульт, смертельные исходы);
- Обнаружена регрессия уже существующих атеробляшек.

**СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА ОЦЕНКИ
ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ:**

ХС, ТГ, ХС ЛПВП и ХС ЛПНП

**При проведении стандартной программы не
выявляется около 50% ДЛП**

**РАСШИРЕННАЯ (УГЛУБЛЕННАЯ)
ПРОГРАММА ОЦЕНКИ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ:**

**ХС, ТГ, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, АПО А-1, АПО В,
ЛП(а), ЭЛЕКТРОФОРЕГРАММА ЛП, NON-ХС
ЛПВП, ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**

Lipid Fractions Linked to Coronary Heart Disease Risk

Adapted from Segrest JP, Garber DW, Brouillette CG, et al. The amphipathic α helix: a multifunctional structural motif in plasma apolipoproteins, *Adv Prot Chem* vol 1994;45:303-369.

Лабораторный контроль липидснижающей терапии

ХС ЛПНП и ХС не-ЛПВП

(ХС не-ЛПВП = общий ХС – ХС ЛПВП)

Общий ХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, АпоВ

Что такое показатель non-HDL СН (ХС не-ЛПВП)?

Это наиболее адекватный и точный лабораторный показатель «липидного» кардиориска. Включает все ХС - содержащие проатерогенные ЛП: ХС ЛПНП; ХС ЛПОНП; ХСЛП(а); ХС ремнантных ЛП и ХС ЛП промежуточной плотности.

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

- гомоцистеин ↑
- ↓ NO (eNOS)
- эндотелин 1 ↑
- ↓ простаглицлин
- тромбоксан ↑
- ангиотензин II ↑
- диметиларгинин ↑

An anatomical illustration of the human heart, showing the four chambers (right and left atria and ventricles) and the major blood vessels (aorta, pulmonary artery, and pulmonary veins). The heart is rendered in a semi-transparent style, revealing internal structures like the valves and coronary arteries. A black arrow points downwards from the top text box to the bottom text box, indicating a causal link between the metabolic syndrome and the cardiovascular risk.

**МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ (МС)
(Синдром инсулинорезистентности;
кардиометаболический синдром)**

**ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
кардиоваскулярного риска**

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ МС

- **Окружность талии:** от/более 80-88 см. у женщин и от/более 94-102 см. у мужчин;
- **Дислипидемия:**
 - а) **ТГ > 1,7 ммоль/л**
 - б) **ХСЛПВП < 1 ммоль/л – мужчины**
< 1,2 ммоль/л – женщины
- **Артериальная гипертензия (АД ≥ 130/85 мм.рт.ст.**
- **Гипергликемия (тощаковая > 6 ммоль/л и постпрондиальная >7,8 ммоль/л**

**ВИСЦЕРАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ
КАК ФАКТОР
КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА
(избыточный липолиз жировой
ткани и массивный выброс в
кровоток СЖК)**

Ожирение (избыточный вес) – как отдельный фактор риска прогрессирования ИС, атеросклероза и диабета 2-го типа

В РФ от лишнего веса страдают 54% мужчин старше 20 лет – у 15% наблюдается ожирение.

Среди женщин – 28,5% страдают от ожирения, при этом лишний вес почти у 59%.

Ожирение (избыточный вес)

- Гипертриглицеридемия как важный, независимый фактор кардиоваскулярных рисков;
- Возникновение и развитие стеатоза гепатоцитов – НАСГ и НАЖБП;
- Роль микробиоты кишечного тракта;
- Генетические факторы.

ГИПЕРТРИГЛИЦЕРИДЕМИЯ.

Кардиориск (риск фатального исхода) у пациентов с различными уровнями ТГ

ГРУППА ПАЦИЕНТОВ (УРОВЕНЬ ТГ)	СТЕПЕНЬ РИСКА
Нормальный	1,06 (1,01-1,12)
Пограничный	1,16 (1,09-1,23)
Повышенный	1,29 (1,22-1,37)
Резкоповышенный	1,68 (1,38-2,06)

АТЕРОСКЛЕРОЗ – БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ (проф. Mark THURSZ , 2015 г.)

У больных с гиперлипидемией неалкогольная жировая болезнь печени наблюдается в 50% случаев.

При МС и высоким ИМТ – в 70-90% случаев и протекает в виде стеатоза печени и неалкогольного стеатогепатита (НАСГ).

С течением времени развиваются фиброз и, затем, цирроз печени.

АТ как хронический воспалительный процесс: роль цитокинов

- Цитокины синтезируются всеми типами клеток, включенных в патогенез АТ (эндотелиальные, гладкомышечные, моноциты-макрофаги, Т-лимфоциты и т.п.);
- Цитокины участвуют в инициации основных стадий АТ: развитии эндотелиальной дисфункции, образования АТ бляшек, хроническом поддержании воспалительного процесса, эрозии и (или) разрыве сформированных АТ бляшек;

ОЖИРЕНИЕ – АДИПОЦИТЫ

Адипоцитокины:

1. Провоспалительные цитокины (основные):
 - Тумор некротизирующий фактор α (TNF α);
 - Интерлейкин -6 (IL-6);
 - Моноцит - хемоатрактивный белок-1 (MCP-1).
2. Адипоциты так же продуцируют:
 - Липотранзин;
 - Ингибитор активатора плазминогена-1 (PAI-1);
 - Простагландины;
 - Адипсин;
 - Лептин;
 - Адипонектин и др.

Risk factors associated with the use of rosuvastatin include an elevated high-sensitivity C-Reactive Protein (CRP) level (>2 mg/L).

Dr Paul M Ridker

Dr Eugene Braunwald

УРОВЕНЬ СРБ (hs-CRP) И РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

2-х кратное повышение риска развития инсульта
(RR=1,9)

3-х кратное повышение риска развития ИМ (RR=2,9)

4-х кратное повышение риска развития поражений
периферического магистрального артериального
русла (RR=4,1)

(RR - за период наблюдения 6 лет и более)

Ridker et al.; N.EngLJ.Med. (1997) 336,973-79

С-реактивный Белок (СРБ) в Кардиологии

1. Уровень СРБ выше у курильщиков, чем у некурящих;
2. Уровень СРБ > 3 мг/л – показатель неблагоприятного прогноза у больных ИС;
3. Уровень риска ССЗ согласно Руководства «Am. Heart Ass.» и «Center for Disease Control» (CDC) 2003г (Pearson et al. Circulation, 2003, 107 : 499):
 - СРБ $< 3,0$ мг/л – средний риск;
 - СРБ $> 3,0$ мг/л - < 10 мг/л – высокий риск;
 - СРБ $> 10,0$ мг/л – связан с воспалением или инфекцией;
4. Контроль эффективности профилактики ИМ при применении аспирина или статинов может быть осуществлен путем мониторингования уровня СРБ

ИССЛЕДОВАНИЕ «CANTOS» (Canakinumab ANtiinflammatory Thrombosis Outcome Study)

- Роль HSCRP в оценке воспалительного процесса как важного звена кардиоваскулярного риска;
- Значение нового лекарственного препарата «Canakinumab» в ингибировании противовоспалительных цитокинов: интерлейкина-1 бета (IL-1 β) и интерлейкина -6 (IL-6) ;
- Возможность применения других лекарственных препаратов (колхицин и др.) для ингибирования воспаления в качестве кардиоваскулярного риска

Ожирение – генетический анализ

An anatomical illustration of a human heart, showing the four chambers (right and left atria and ventricles) and the major blood vessels (superior and inferior vena cava, aorta, and pulmonary artery and vein). The heart is rendered in a semi-transparent style, revealing internal structures like the valves and coronary vessels.

82% россиян имеют генетический фактор риска (ген FTO - fat mass and obesity-associated), регулирующий степень ожирения у человека. В европейской популяции, люди, гомозиготные по аллелю этого гена (RS 9939609 (A)) имеют риск ожирения в 1,7 раза выше среднего. У россиян в 45% случаев выявлен «мягкий» вариант этого гена, а у 33% - «жесткий».

Генетические факторы ожирения и избыточного веса

На основе геномного анализа более пяти тысяч коренных жителей архипелага Самоа (уровень ожирения в этом регионе самый высокий в мире) был выявлен конкретный вариант (аллель) гена CREBRF. Наличие этого гена способствует увеличению индекса массы тела в полтора раза, повышая риск ожирения на 30-40 процентов.

ОЖИРЕНИЕ

- **Лабораторные исследования:**
 1. Липопротеидный (липидный) профиль;
 2. Аналиты – показатели функции и повреждений печени;
 3. Оценка функции щитовидной железы;
 4. «Тощаковая» глюкоза и гликозилированный Hb (Hb A1c)
- **Оценка степени ожирения**
- **Ведение и лечение пациентов с ожирением:**
 1. Диета и образ жизни (life style);
 2. Медикаментозная терапия;
 3. Хирургическое лечение.

Basic criteria for suitability for bariatric/metabolic surgery

- Body mass index (BMI) ≥ 40 without weight-related comorbid condition
- BMI ≥ 35 with ≥ 1 weight-related comorbid condition (diabetes, obstructive sleep apnea, hypertension, hyperlipidemia, or metabolic syndrome)

Worldwide, there are more than 2.1 billion obese people

Bariatric surgery reduces the risk of premature death by **30-40%**

Gastric Bypass Anatomy:

Некоторые комментарии некоторых ведущих кардиологов:

- Наступила новая эпоха в борьбе с ССЗ;
- «Сердито, но очень дорого»:
- - годовой курс лечения ингибиторами PCSK9 от 14 000 долларов США. Лечение моноклональными антителами «Санакинумаб» приблизительно 200 тысяч USD. Может быть лучше соблюдение диеты и физической активности?
- Впечатляющее снижение атерогенного ХС и ингибирование воспалительного компонента - О.К!
- НО... цена ...
- ВСЕМ УСПЕХА И ЗДОРОВЬЯ

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

ВОПРОСЫ

???